



**CUALQUIER COMPAÑERO SEXUAL QUE TIENE UNA HISTORIA DE ALERGIA A ESTE ANTIBIÓTICO O LA CLASE FARMACÉUTICA DE ANTIBIÓTICOS NO DEBE TOMAR ESTE ANTIBIÓTICO Y DEBE SER EXAMINADO INMEDIATAMENTE POR UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA**

SPANISH INFORMATION SHEET FOR ERYTHROMYCIN  
ERITROMICINA ENTERICA, ETILSUCCINATO DE ERITROMICINA - ORAL,  
TABLETA

**USOS:** La eritromicina es un antibiotico que se usa para el tratamiento de una gran variedad de infecciones bacterianas, tales como infecciones de las vias respiratorias, infecciones del oido medio e infecciones de la piel.

**MODO DE EMPLEO:** El medicamento deber tragarse entero para evitar el malestar estomacal. Este medicamento puede tomarse junto con los alimentos o con leche si usted sufre de malestar estomacal. Los antibioticos son mas efectivos cuando la cantidad del medicamento en el cuerpo se mantiene a un nivel constante. Para lograr esto, tome su medicamento a intervalos regulares durante el dia y la noche. Continue tomando este medicamento hasta que la cantidad indicada se termine por completo, aun si los sintomas desaparecen despuus de unos cuantos dias. La suspension anticipada del medicamento puede permitir que la bacteria continue desarrollandose, lo cual puede causar una reincidencia de la infeccion.

**EFFECTOS SECUNDARIOS:** Este medicamento puede causar malestar estomacal, diarrea, perdida del apetito, nausea, vomitos o espasmos digestivos durante los primeros cuantos dias, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Informe a su medico si cualquiera de estos sintomas persiste o se agrava.

**PRECAUCIONES:** Este medicamento no debe usarse durante el embarazo a menos que sea claramente necesario. Este medicamento se encuentra en pequenas cantidades en la leche materna, por lo tanto, usted deber consultar con su medico antes de amamantar.

Antes de tomar este medicamento, avise a su medico si usted padece o ha padecido de enfermedades del higado o de ictericia (color amarillo en los ojos o en la piel).

Deseche cualquier porcion de su receta medica que no haya sido usada despuus de que su medico le indique que suspenda el medicamento. Es posible que la eritromicina pierda sus efectos con el tiempo, y no deber guardarse para el tratamiento de otras infecciones.

**INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:** Informe a su medico si usted est usando cualquier otro medicamento, especialmente carbamazepina, ciclosporina, teofilina, triazolam, warfarina, terfenadina o astemizol.

**DOSIS OMITIDA:** Si usted omite una dosis, tomela en cuanto lo recuerde, a menos que sea casi hora de tomar la siguiente dosis.

Si este es el caso, no tome la dosis que omitio y vuelva a su plan de dosificacion usual. No tome una dosis doble para compensar.

**CONSERVACION:** Este medicamento debe guardarse a temperatura ambiente, protegido de la humedad y de la luz del sol. No guarde este medicamento en el cuarto de bano.



*DELAWARE HEALTH AND SOCIAL SERVICES*

---

Division of Public Health

Reviewed 12/19/16 by Cardinal Health Pharmacy Services