



CUALQUIER COMPAÑERO SEXUAL QUE TIENE UNA HISTORIA DE ALERGIA A ESTE ANTIBIÓTICO O LA CLASE FARMACÉUTICA DE ANTIBIÓTICOS NO DEBE TOMAR ESTE ANTIBIÓTICO Y DEBE SER EXAMINADO INMEDIATAMENTE POR UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA

LEVOQUIN-(LEVOFLOXACINO)

USES: Este medicamento es un antibiotico que se usa para el tratamiento de una gran variedad de infecciones bacterianas que incluyen infecciones de la via urinaria, infecciones de la piel, o infecciones de la via respiratoria.

MODO DE EMPLEO: Debe tomarse por via oral, normalmente una ves al dia o segun las indicaciones. Puede tomelo 2 horas antes o 2 hours despues de tomar este medicamento: Zinc, hierro, sucralfato, productos lacteos, o antiacidos que contengan magnesio/calico/aluminio. Los antibioticos surten el efecto maximo cuando la cantidad del medicamento en el cuerpo se mantiene a un nivel constante. Para que se produzca este efecto, tome este medicamento a la misma hora del dia o de la noche. Aunque los sintomas desaparezcan despues de unos dias, continue tomando este medicamento hasta que haya tomado todo el medicamento recetado. Es posible que la suspension premature de este farmaco permita que la bacteria continue desarrollandose y la infeccion pueda repetirse.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Durante los primeros dias., hasta que el cuerpo se adapte al medicamento es posible que le cause perdida de apetito, problemas para dormir, diarrea, nauseas, dolor de cabeza o mareo. Informe a su medico si estos efectos persisten o si llegan a ser severos. Es muy poco probable que el uso de este medicamento le cause Dolores o sensibilizacion de los musculos en los brazos o piernas, malestar vaginal, dolor abdominal, cambios en la vision, confulsiones, confusion, somnolencia, alteraciones mentales o animicas, o ansiedad, no obstante, avise inmediatamente al medico si esto ocurre. Advierta inmediatamente a su medico si se produce una reaccion alergica a este farmaco. Entre los sintomas de una reaccion alergica se incluyen problemas respiratorios, erupciones cutaneas, urticaria, o picazon.

PRECAUCIONES: Si este medicamento le produce mareo, desvanecimiento, a somnolencia, tenga cuidado cuando conduzca o realice tareas que requieran estar despejado. Limite el consumo de alcohol. Puesto que este farmaco puede aumentar la sensibilidad al sol, evite exponerse al sol durante periodos prolongados. Pongase ropa protectora y use cremas para el sol cuando este al aire libre. Durante el embarazo use este medicamento solo en el caso de que verdaderamente lo necesite. Este medicamento se excreta en la leche materna. Es posible que tenga que dejar de amamantar o dejar de usar este farmaco. Consulte a su medico antes de amamantar.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS: Antes de usar este farmaco, informe a su medico si usa cualquier otro medicamento con o sin receta medica, especialmente teofilina, otros antibioticos, anticoagulants (diluents de la sangre), agents antiinflamatorios no esteroidales, (p.ej.: ibuprofeno, naproxeno, aspirina), antiacidos, sucralfato, hierro, zinc, medicamentos para la diabetes, vacunas vivas, o quinapril

ADVERTENCIAS: Le han recetado este medicamento solamente para la enfermedad actual. No lo use mas tarde para otra infeccion ni lo comparta con nadie. Es posible que para las otras enfermedades le receten un medicamento distinto.

DOSIS OMITIDA: Si omite una dosis, tomela en cuanto se acuerde, a menos que sea casi la hora de la dosis siguiente. En tal caso, no tome la dosis que olvido y siga con el horario de dosificacion ya establecido. No tome una dosis doble.



DELAWARE HEALTH AND SOCIAL SERVICES

Division of Public Health

CONSERVACION: Este medicamento debe conservarse a temperatura ambiente entre 59 y 86 grados F (15-30 grados C) , protegido de la humedad y de la luz solar. No lo conserve en el cuart de bano. Mangenga el envase bien cerrado.

Reviewed 12/19/16 by Cardinal Health Pharmacy Services