



DELAWARE HEALTH AND SOCIAL SERVICES

Division of Public Health

CUALQUIER COMPAÑERO SEXUAL QUE TIENE UNA HISTORIA DE ALERGIA A ESTE ANTIBIÓTICO O LA CLASE FARMACÉUTICA DE ANTIBIÓTICOS NO DEBE TOMAR ESTE ANTIBIÓTICO Y DEBE SER EXAMINADO INMEDIATAMENTE POR UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA

SPANISH INFORMATION SHEET FOR METRONIDAZOLE METRONIDAZOLE – ORAL

USOS: El metronidazol es un antibiotico usado para el tratamiento de una gran variedad de infecciones.

MODO DE EMPLEO: Este medicamento debe tomarse junto con los alimentos o con un vaso lleno de agua o leche para evitar el malestar estomacal.

Los antibioticos son mas efectivos cuando la cantidad del medicamento en su cuerpo se mantiene a un nivel constante. Para lograr esto, tome su medicamento a intervalos iguales durante el día y la noche.

Continúe tomando este medicamento hasta terminar completamente la cantidad indicada, aun si los sintomas desaparecen despues de unos cuantos días. La suspension anticipada de este medicamento puede permitir que la bacteria continúe desarrollandose, lo cual puede causar una reincidencia de la infeccion.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Puede causar malestar estomacal, diarrea, perdida del apetito, nausea, mareo y dolor de cabeza durante los primeros cuantos días, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento.

Informe a su medico si estos sintomas persisten o se agravan.

Algunas personas experimentan un sabor a metal en la boca al estar tomando este medicamento. Este efecto desaparecer al suspender el medicamento.

Es posible que cause obscurecimiento del color de la orina. Esto no deber causar preocupacion.

Informe a su medico si comienza a sufrir de erupciones de la piel, urticaria, dolor al orinar, ulceraciones de la boca y hormigueo en las manos o en los pies mientras est, tomando este medicamento.

PRECAUCIONES: Durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo, use el metronidazol solo si es claramente necesario. Puesto que este medicamento aparece en la leche materna, no se recomienda amamantar. Deber consultar a su medico.

Evite el consumo de bebidas alcoholicas mientras est, tomando este medicamento ya que puede producir malestar estomacal, nausea, vomitos, dolor de cabeza y rubor severos.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS: Informe al doctor de su historial medico completo y de todos los medicamentos que este usando ya sea con o sin receta medica, especialmente si toma "anticoagulantes" como Coumadin o fenobarbital. Es posible que sea necesario cambiar su dosificacion. No tome este medicamento si esta tomando disulfiram (Antabuse) para el tratamiento del alcoholismo. Comuniquese con su medico.

ADVERTENCIAS: Para el tratamiento de ciertas infecciones (tricomoniasis), es posible que se requiera que las parejas sexuales reciban tratamiento tambien para evitar la reincidencia de la infeccion. Durante la terapia, abstengase de mantener relaciones sexuales o use un condon.

Este medicamento ha sido indicado solamente para su condicion actual. No lo debe usar para el tratamiento de una infeccion diferente ni lo debe compartir con otra persona. Es posible que para una infeccion subsecuente sea necesario usar un medicamento diferente.

DOSIS OMITIDA: Si omite una dosis, tomela en cuanto que se acuerde; no la tome si esta cerca de la hora de la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis que omitio y vuelva a su horario normal de dosificacion. No tome una dosis doble para ponerse al día.

CONSERVACION: Este medicamento debe guardarse a temperatura ambiente, protegido de la humedad y de la luz solar. No lo guarde en el cuarto de baño.



DELAWARE HEALTH AND SOCIAL SERVICES

Division of Public Health

Reviewed 12/19/16 by Cardinal Health Pharmacy Services



DELAWARE HEALTH AND SOCIAL SERVICES

Division of Public Health